

# SWEETLIX ENGORDAR GUARDIA (11453)

## Atributos de alimentación

- Medicados con poloxalene para la prevención de leguminosas (alfalfa, trébol) y engordar de pasto de trigo en el ganado.
- Para ser usados como un vendaje arriba las raciones individuales de piensos de terreno.
- Uso de inicio 2 o 3 días antes de la exposición a la producción de engordar las condiciones y seguir utilizando como ganado es expuesto a la producción de engordar las condiciones.
- Scoop medida conveniente incluido.

## Alimentación y gestión

1. Para alimentar a una velocidad de 0,8 onzas de bloque por 100 libras de peso por día. Ejemplo: 8 onzas (0,5 kg) del bloque para un animal de 1000 libras diarias.
2. Para una protección adecuada es esencial que cada animal consume el total recomendado diariamente dosis de bloque de © SWEETLIX © inflar guardia.
3. Omitir todas sal de piensos. No se alimentan fuentes de libre elección de sal o de minerales que contienen sal en cualquier forma. Estos bloques son una fuente adecuada de sal.
4. Iniciar alimentación bloques continuamente. Feed bloques y completa alimentación seca no leguminosa hay por lo menos 48 horas antes de su consumo de leguminosas (alfalfa, trébol). Repetir cuando se interrumpe el consumo de bloque para mantener el control.
5. Proporcionar bloque de al menos 1 de cada 5 cabezas de ganado; Añadir 1 bloque adicional cuando cada bloque ha sido consumido por el medio.
6. La ubicación del bloque es extremadamente importante para el consumo adecuado. Bloques de lugar donde ganado reúnen (zonas de riego, pastos y loafing) para limitar la distancia un animal deben viajar a tiene acceso a un bloque.
7. Prácticas de pastos controladas (Faja de pastoreo) se recomiendan para limitar la distancia que debe viajar a un animal que tiene acceso a un bloque.
8. En algunos casos puede ser necesario limitar el ganado bastante seco con bloques de guardia de inflar

de SWEETLIX adicionales durante un período cada día.

## ADVERTENCIA

Acceso a y la ingesta de bloques, pueden ser limitadas durante o directamente después de la fuerte lluvia o Rocío y después de las heladas o cambio de pastos. Variación en la rutina de ganado puede cambiar sus hábitos de alimentación y riego. Reubicar bloques inmediatamente en caso necesario. Precauciones especiales. Agua alcalina y alto contenido de sal suelos limitar el consumo y rendimiento.

## PRECAUCIÓN

**Uso como dirigida.** No debe exceder el consumo de selenio 3 mg por cabeza todos los días.

## Análisis garantizado

PROTEÍNA CRUDA	(mín)	4.0%
GRASA CRUDA	(mín)	0.5%
FIBRA CRUDA	(máx)	12.5%
SAL	(mín)	19.5%
SAL	(máx)	23.0%
POTASIO	(mín)	1.8%
YODO	(mín)	43 ppm
SELENIO	(mín)	13 ppm
VITAMINA A	(mín)	ninguno añadido

## Lista de ingredientes

Caña melaza, cascots de soja, sal, hidrolizada de grasa Animal, óxidomanganoso, óxido de Zinc, Carbonato ferroso, sulfato de cobre, yoduro de potasio, carbonato de cobalto, selenito sódico, etilendiamina Dihydriodide y carbonato de calcio.

### 33# SBG

