

K CHICK STARTER CRUMBLE MED

Como ayuda en la prevención de la coccidiosis causada por Eimeria tenella sólo.

INGREDIENTE ACTIVO DE DROGAS

Amprolium% 0.0125

Instrucciones de alimentación

Alimentación como la única ración a los polluelos de día de edad hasta las pollitas son 6 semanas de edad. Fresco, siempre proporcionar agua potable.

Consideraciones especiales

No utilice amprolio en las fuentes que contienen bentonita.

ADVERTENCIA

Retirar 5 días antes del sacrificio. Utilizar como una única fuente de amprolio.

Análisis garantizado

PROTEÍNA CRUDA	(mín.)	21.0%
GRASA BRUTA	(mín.)	2.2%
FIBRA CRUDA	(máx.)	5.2%
CENIZA	(máx.)	9.7%
FÓSFORO	(mín.)	0.5%
CALCIO	(mín.)	0.8%
CALCIO	(máx.)	1.5%

Lista de ingredientes

Soja comida, maíz molido, terreno trigo, trigo Millrun, melaza, carbonato de calcio, fosfato dicálcico, aceite vegetal, amprolio 2,5%, sal, cloruro de colina, sulfato de hierro, óxidomanganeso, óxido de Zinc, Ethoxyquin, niacina, Suplemento de vitamina E, selenio de sodio, sulfato de cobre, D-calcio pantotenato, etilendiamina Dihydroiodide, biotina, Menadione Piridoxina clorhidrato, riboflavina, Suplemento de vitamina a de suplemento, ácido fólico, vitamina B12, Suplemento de vitamina D3, metionina líquido.

50# K53555

MEDICAMENTOSOS

