

# U CHICK STARTER MASH

Como ayuda en la prevención de la coccidiosis causada por Eimeria tenella sólo.

## INGREDIENTE ACTIVO DE DROGAS

Amprolium .....% 0.0125

### Instrucciones de alimentación

Alimentación como la única ración a los polluelos de día de edad hasta las pollitas son 6 semanas de edad. Fresco, siempre proporcionar agua potable.

### ADVERTENCIA

Retirar 5 días antes del sacrificio. Utilizar como una única fuente de amprolio.

### Consideraciones especiales

No utilice amprolio en las fuentes que contienen bentonita.

### Análisis garantizado

|                |        |       |
|----------------|--------|-------|
| PROTEÍNA CRUDA | (mín.) | 21.0% |
| GRASA BRUTA    | (mín.) | 2.3%  |
| FIBRA CRUDA    | (máx.) | 5.4%  |
| CENIZA         | (máx.) | 9.7%  |
| FÓSFORO        | (mín.) | 0.6%  |
| CALCIO         | (mín.) | 0.8%  |
| CALCIO         | (máx.) | 1.5%  |

### Lista de ingredientes

Masa de maíz, harina de soja, trigo Millrun, salvado de arroz, carbonato de calcio, fosfato dicálcico, melaza, amprolio 2,5%, sal, cloruro de colina, sulfato de hierro, óxidomanganoso, óxido de Zinc, Ethoxyquin, niacina, Suplemento de vitamina E, selenio de sodio, sulfato de cobre, D-calcio pantotenato, etilendiamina Dihydroiodide, biotina, Menadione, clorhidrato de piridoxina Riboflavina, Suplemento de vitamina B12, ácido fólico, Suplemento de vitamina A, Suplemento de vitamina D3, metionina líquido.

**50# U53605**

